



D.I. 質問箱

Q24

ワーファリン投与時に注意しなければいけない食物は何でしょうか？

A24

■ビタミン K が多く含まれる食品はワーファリンの効き目を打ち消します。

■アルコールが血中にある場合、ワーファリンの作用が増強されます。

1	納豆、クロレラ、青汁、ブロッコリー、ホウレンソウは禁止。
2	緑葉野菜はとくに制限はありませんが、一時的な大量あるいは少量摂取は避け、普通量をコンスタントに摂取してください。
3	偏食、大量飲酒をしないこと。

参考：エーザイ株式会社「ワーファリンの適正使用情報」、その他

文責：井上典子(医長)

お問合せ：学術データインフォメーション（DI）まで

0120-14-8734（フリーダイヤル） / 082-247-4325（ダイヤルイン）



きやうぽーる

当検査センターでは、ルーチン検査以外にも健診業務真っ只中です。

内訳としては、学童尿検診が約 4 万 5 千人、学童心臓病検診が約 2 万 5 千人、教職員健診、学童蟯虫検査、企業の検便検査、従業員血液検査、そして耳鼻科検診器具の滅菌および貸出し業務が約 15 万本等、また、夏休みになると姿勢検診も始まります。

毎年恒例のこの時期は、季節感を味わうゆとりもなく、気がつけばいつのまにか桜も散り、フラワーフェスティバルも終わり、あっという間に夏を迎えています。

職員一同頑張っております。よろしくお願いいたします。

山崎 雅昭（検査科技師長）

広報委員

松本 道雄 / 藤本 誠 / 伊丸 直樹 / 中村 賢作 / 渡川 美弥子 / 初岡 博

